用于辉瑞公司疫苗
（2022 年 1 月）

新冠疫苗接种说明书

关于新冠疫苗

本疫苗已被列入针对新型冠状病毒(SARS-CoV-2)的国家及地方政府的疫苗接种计划，其接种费用由公共资金承担，并对所有有接种意愿的人免费接种，本疫苗的追加接种（第 3 回）适用于 18 岁及以上人群接种。

疫苗效果及接种方法

本疫苗由辉瑞公司制造，使接种者能预防感染新冠病毒。

研究结果发现：经过第 3 次追加接种的人在接种后 1 个月体内的抗体数量比完成第 2 次接种 1 个月后体内的抗体数量高数倍。

商品名称	復必泰□（Comirnaty□）肌肉注射
作用与用途	预防由新型冠状病毒（SARS-CoV-2）引起的感染性疾病
免疫程序	1 剂（需与第 2 次接种间隔一定的时间）*肌肉注射
接种对象	18 岁及以上人群（追加疫苗对未满 18 岁人群的有效性和安全性尚不明确。）
接种剂量	1 次 0.3ml 共 1 剂

- 第 2 次疫苗接种与第 3 次追加接种的间隔因对象者的个人情况而异（目前大致上要求 6 至 8 个月的间隔）。具体请参照您居住地的政府的相关通知。
- 无论您前 2 次接种的疫苗是何种，第 3 次追加接种都可以选择本疫苗。
- 即使您完成了第 3 针追加接种，也无法保证完全预防感染。请在日常生活中继续做好预防工作。

禁忌

下列群体不适宜接种本疫苗。如果您符合以下任一情况，请务必在接种前的问诊中明确告知医生。

- 发热患者 (*1)
- 急重症患者
- 既往发生过疫苗严重过敏反应者(*2)
- 除上述情况外其它不适宜接种的人群：

(*1) 明显发热症状通常指体温高达或超过 37.5℃。但是即使体温低于 37.5℃，这不一定适用于根据常规体温被诊断为发热的情况。

(*2) 过敏反应以及多种过敏症征兆，包括全身性皮肤和黏膜症状、气喘、呼吸困难、心动过速或低血压症状。如果您在第 1 次或第 2 次接种中被诊断为过敏反应，则您不能使用与第 1 或第 2 次接种同样的疫苗进行追加接种。

慎用人群

符合下列任一情况的，需慎用疫苗。如果您遇到下列情况，请务必在接种前的问诊中明确告医生。

- 正在进行抗凝血治疗、患血小板减少症或凝血功能障碍症者
- 曾被诊断为免疫缺陷、或近亲患有先天性免疫缺陷者
- 患有心脏、肾脏、肝脏或者发育障碍等基础疾病者
- 曾接种过疫苗并在接种两天内出现发热、全身皮疹等疑似过敏者
- 曾出现过痉挛症状者
- 可能对本品所含任何成分过敏者

如果您处于孕期或可能怀孕、或处于哺乳期，请务必在接种前的问诊中明确告知医生。但即使您尚未咨询您的产科主治医，经预诊医师确认适合接种的情况下也可以进行追加接种。本疫苗产品含有未在其它疫苗中使用过的添加成分。如果您曾对药物有过超敏或过敏反应，请务必在接种前的问诊中明确告知医生。

(续背面)

注意事项

●完成疫苗接种后请您在接种点至少等候 15 分钟（如果您曾出现过包括过敏性休克在内的严重过敏反 应，或出现恶心、头晕等症状，请至少等候 30 分钟）。如果您接种疫苗后感到不适，请立即联系医 生。（便于医务人员处理疫苗接种后的突发不良反应。）

●疫苗接种部位需保持清洁干净。虽然疫苗接种当天洗浴并无大碍，但请不要揉擦接种部位。

●正常生活不受影响，但接种当天请避免剧烈运动以及过度饮酒等。

不良反应

●主要的不良反应症状表现为：接种部位疼痛、头痛、关节和肌肉疼痛、疲劳感、发冷以及发热症 状。罕见的严重不良反应包括休克及过敏症。由于本疫苗属于新型疫苗，有可能引起一些目前尚未 发现或明确的症状。如果您在疫苗接种后察觉到任何相关症状，请联系接种医师或您的家庭医生。

●有报告显示，极少数人在接种疫苗后出现了轻度的心肌炎或心包炎症状（*）。如果在接种疫苗后几 天内出现胸痛、心悸、气喘、浮肿等症状，请您尽快就医。

（*）与第一剂相比，这种症状多见于接种完第二剂疫苗后，年轻人、尤其是男性更多见。

●第 3 次追加接种与前 2 次接种相比，腋下淋巴结的肿胀症例出现比例较高（5%）。多数情况下，症状会在数日内消失，但如果肿胀严重或长期不愈，请去医院就诊。

关于疫苗引发的健康损害的保障机制

疫苗接种可能会引起一些健康问题（例如疾病或残疾）。尽管这属于极端案例，但其潜在风险不容忽视，所以已建立起一套针对该风险的保障机制。

如果因接种新冠疫苗而引起健康损害，《预防接种法》同样明文规定了相关保障措施（医疗费、伤残抚恤金等）。相关保障的申请程序请咨询您住所地区的地方政府。

关于新冠病毒传染病

感染新型冠状病毒（SARS-CoV-2）后，患者会出现发热、咳嗽等类似普通感冒的症状。尽管多数轻症患者能被治愈，但是一旦重症化就会出现呼吸困难等重症肺炎症状，严重者会致死。

本次被批准的新冠疫苗（辉瑞公司制）的特点

本疫苗属于信使 RNA （mRNA） 疫苗。配方中的信使 RNA 会嵌入脂膜，它是新冠病毒(SARS-CoV-2)刺突蛋白（病毒入侵人体细胞时所需的蛋白）的“蓝图”。当信使 RNA 通过疫苗接种进入人体后，病毒性刺突蛋白会按 照信使 RNA 在人体细胞内生成，由此诱发对抗刺突蛋白的中和抗体和细胞免疫反应，后者能预防感染新冠病 毒。

本疫苗包含以下成分：

活性成分	◇ Tozinameran （mRNA，编码附着在人体细胞膜的全长刺突蛋白）
添加成分	◇ALC-0315：[(4-羟丁基)氮杂二基)]双(己烷-6,1-二基)双(2-己基癸酸酯) ◇ ALC-0159：2 [(聚乙二醇)-2000] N,N-二十四烷基乙酰胺 ◇ DSPC：1,2-二硬脂酰基-sn-甘油-3-磷酸胆碱 ◇ 胆固醇 ◇ 氯化钾 ◇ 磷酸二氢钾 ◇ 氯化钠 ◇ 磷酸氢二钠二水合物 ◇ 蔗糖

新型コロナワクチンの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。 厚労 コロナ ワクチン 検索

ホームページをご覧になれない場合は、札幌市の一般お問い合わせ専用電話（011-351-8646）にご連絡ください。